Serratula cerinthifolia (Sm.) Boiss.

الاسم العلمي: Serratula cerinthifolia (Sm.) Boiss.

الفصيلة: ASTERACEA

الاسم المحلي: الوريقة (العشبة الضارة)

التوصيف:

نبات عشبي معمر، طوله 30- 40 سم. ساقه قائمة، غير متفرعة، مضلع، ملساء. الأوراق القاعدية معنقة، رمحية مقلوبة إلى ملعقية أو بيضاوية مقلوبة، أو مفصصة ريشية، الفص الطرفي اكبر من الفصوص الجانبية، طولها 9- 12 سم، الأوراق الساقية متبادلة، لاطئة، رمحية مقلوبة إلى بيضاوية مقلوبة، محتضنة للساق، حافتها مسننة غير منتظمة، طولها 1- 9 سم، قمتها ذات تدبب مشوك صغير. الأوراق تصبح سوداء عندما تجف.الرؤيسات وحيدة، طرفية، متطاولة طولها 2,5- 3 سم، القنابات صفراء، جافة، في عدة صفوف، تحمل أوباراً دقيقة، القنابات الخارجية بيضاوية، الداخلية رمحية. الأزهار صفراء، شعاعية، طولها 2,5 سم، تتخللها أوبار طويلة بيضاء. الثمار سبسلاء، مضلعة خماسية. المناثير ريشية قصيرة.

الصورنات:

موطن: الترب الرجافة

أشهر الإزهار: 8 7 6 5

حياة:

الانتماء الجغرافي: SOON

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

خطوط الطول	خطوط العرض	المحافظة	المدينة	القرية
محمية الفرنلق	منطقة اللاذقية	اللاذقية	:: E	:: N

الصور

المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/