



# Lactuca viminea (L.) J et Presl.

الاسم العلمي: Lactuca viminea (L.) J et Presl.

الفصيلة: ASTERACEA

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي ثنائي الحول أو معمر، جذوره هغزية، سويكة، طولها 50-100 سم، أهلس. الأوراق السفلى هجزة ريشية، يصل طولها 15 سم، الفصوص رحية ذات تفصص قليل أو تسنن غير منتظم. الأوراق الساقية لاطنة، قواعدها بها زائدتين طويلتين ملتصقتين بالساق لأسفل بطول 1-2 سم، الأوراق العلوية رحية- مثلثية، هدية. الهامات عديدة، طرفية وجانبية، طولها 12 سم، متطولة تحتوي على 5 أزهار. القنابات الغلافية لينة، هلساء، عدة طبقات، حوافها غشائية الخارجية قصيرة. الأزهار بيضاوية، الداخلية طويلة، شريطية. الأزهار صفراء، طولها 9 مم السبسلاء بنفسجية داكنة اللون. الثمار بيضاوية، مغطاة بغطاء صلب، تحتوي على 7-9 خطوط على كل جانب، تخربق النوع من بلاد إيران إلى الهند، ولكن حسب كيو النوع هو البديل أو المرادف للنوع *Lactuca viminea* Scarola في الأورد *Lactuca viminea* (L.) W. Schmidt التربة الحصوية موطن:

98765

أشهر الإزهار:

حياة:

توراني ومتوسطي ايراني

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية: نوع جديد record New

القرية	الهدينة	الحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



## المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/  
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011