



# Lactuca viminea (L.) J et Presl.

الاسم العلمي: Lactuca viminea (L.) J et Presl.

الفصيلة: ASTERACEA

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي ثنائي الحول أو معمر، جذوره هغزية، سميكة، طولها 50-100 سم، أهدس. الأوراق السفلى هجزأة ريشية، يصل طولها 15 سم، الفصوص رهمية ذات تفصص قليل أو تسنن غير منتظم. الأوراق الساقية لاطنة، قواعدها بها زائدتين طويلتين ملتصقتين بالساق لأسفل بطول 1-2 سم، الأوراق العلوية رهمية- مثلثية، همدية. الهامات عديدة، طرفية وجانبية، طولها 12 سم، متطولة تحتوي على 5 أزهار. القنابات الغلافية لينة، هلساء، عدة طبقات، حوافها غشائية الخارجية قصيرة، ههزات بيضاوية، الداخلية طويلة، شريطية. الأزهار صفراء، طولها 9 مم السبسلاء بنفسجية داكنة سوداء، رهمية إلى اهلابحية ضيقة، هزخفة، تحتوي على 7-9 خطوط على كل جانب، تخزيق النوع لم يرد في مونيرد ولكن حسب كيو النوع هو البديل أو المرادف للنوع *Viminea Scarioha* تدريجيا إلى هوقار طويل بسطوي طول الثمرة، الهناثير وتساقطة. مونيرد في الورد P.W. Schmidt (L.) الترب الحصوية هوطن:

9 8 7 6 5

أشهر الإزهار:

حياة:

توراني ومتوسطي إيراني

الانتهاه الجغرافي:

لون الزهرة:

القيومة الاقتصادية: نوع جديد record New

القرية	الهدينة	الهحافطة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



## المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/  
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011