



# Lactuca viminea (L.) J et Presl.

الاسم العلمي: Lactuca viminea (L.) J et Presl.

الفصيلة: ASTERACEA

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي ثنائي الحول أو معمر، جذوره هغزلية، سميكة، طولها 50-100 سم، أهلس. الأوراق السفلى هجزأة ريشية، يصل طولها 15 سم، الفصوص رهمية ذات تفصص قليل أو تسنن غير منتظم. الأوراق الساقية لاطنة، قواعدها بها زائدتين طويلتين ملتصقتين بالساق لاسفل بطول 1-2 سم، الأوراق العلوية رهمية- مثلثية، همدية. الهامات عديدة، طرفية وجانبية، طولها 12 سم، متطاولة تحتوي على 5 أزهار. القنابات الغلافية لينة، هلساء، عدة طبقات، حوافها غشائية الخارجية قصيرة. الأزهار بيضاوية، الداخلية طويلة، شريطية. الأزهار صفراء، طولها 9 مم السبسلاء بنفسجية داكنة اللون. الثمار بيضاوية، طولها 7-9 مم، تحتوي على 7-9 حبوب. كل حبة تحتوي على نوع من زيوت الطيار ولكن حسب كيو النوع هو البديل أو المرادف للنوع *Viminea Scarioha* (L.) W. Schmidt في الأوراق بسطوي طول الثمرة، الهناثير وتساقطة. التربة الحصوية موطن:

98765

أشهر الإزهار:

حياة:

توراني ومتوسطي ايراني

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية: نوع جديد - فلورة سورية

القرية	الهدينة	الهحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



## المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/  
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011