

Cotoneaster racemiflorus (Desf.) Schldl.

الاسم العلمي Cotoneaster racemiflorus (Desf.) Sieber**الفصيلة:** ROSACEAE**الاسم المحلي:** سفرجلية**التوصيف:**

شجيرة أو شجرة صغيرة فروعها بنية محمرة ومغبرة عندها تكون فتية. الأوراق دائرية سطحها العلوي أخضر وسطحها السفلي ابيض لبادي. البتلات بيضاء شبه دائرية أفقية. السبلات مثلثة. الثمرة حمراء شبه كروية.

المهيزات:

لا يرد النوع في فلورة هوتيرد ويرد انتشاره في سورية حسب كيو

بيئات شبه جافة إلى شبه رطبة ينمو على السفوح الصخرية الكلسية والتهتولة في غابات الصنوبر والبلوط . محب للضوء, وتحمل للظل, مقاوم للصقيع, بشكل عام غير متطلب للتربة ولذا يعيش على التربة الصخرية والكلسية.

موطن:**أشهر الأزهار:****حياة:**

إيراني

الانتهاج الجغرافي:**لون الزهرة:****القيمة الاقتصادية** record New plant Forest غابوي

القرية	الهدينة	الحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- Plants of World Online/Kew Royal Botanic Garden/
Year/<https://powo.science.kew.org/taxon/>