

Arbutus andrachne L.

Arbutus andrachne L.

الاسم العلمي:

ERICACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي: قطلب

التوصيف:

شجرة أو شجيرة دائمة الخضرة ذات أوراق جلدية. الجذع والأغصان ملساء ذات قشرة حراء تتفلس على شكل قطع كبيرة. الأزهار مرتبة في عنقود. التويج أبيض أو شهوي اللون. الأسدية عشرة لكل منها مئبر ذو قرنين ينفتح بواسطة ثقبين. حب الطلع متجهج في رباعيات. يتم التأبير عن طريق النحل. الثمرة حراء صالحة للأكل تنضج في الخريف. هذا النوع تابع لشرق حوض المتوسط كثير الانتشار في الهاكي والغابات وخاصة في الهضاب الطليعة. يلفت النظر بلون أغصانه الأحمر ونورته الجوهية. النباتات البينية قليلة وينمو في نفس الوقت على التربة زدينا البيضاء الغنية بالكلس وكذلك على التيراروزا. مقاوم للجفاف ومحب للضوء. الأوراق تحتوي على التانيدات. يعيش طبيعياً داخل الغابات السنديانية والصنوبرية. يزداد انشاره عادة في الغابات التي سبق وتعرضت لحرائق متكررة، يقاوم البرن. ويتحمل التربة الجافة والرياح.

4 3 2

أشهر الإزهار:

حياة:

توراني

الانتهاج الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية غابوي plant Forest

القرية

الهدينة

خطوط العرض المحافظة

خطوط الطول

:: N

:: E

منطقة اللاذقية اللاذقية

محمية الفرنلق



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011